

## Instructions for use

Once Weekly

# Sematide



(Semaglutide)

Single Dose Prefilled Syringe 0.25mg 0.50mg 1mg




**BIOF**  
BIOSCIENCES

**FEROZSONS**  
LABORATORIES LIMITED




Take the Pre-Filled Syringe and needle out of the provided tray.




Remove the packaging of the needle by pulling the flaps of the cover in opposite directions.




Hold the syringe in an upright position. Remove the luer lock by rotating it in the anti-clockwise (left) direction.




Keeping the Pre-Filled Syringe in an upright position, attach the needle to the body of the Syringe by rotating the needle in clockwise (right) direction and carefully pull off the needle cap before use.




To remove the air from syringe, push the plunger rod till a drop appears at the tip of the syringe.



Sematide Pre-Filled Syringe may be injected at any site as shown in picture. Clean a small area of skin with an alcohol swab. Let the alcohol dry completely before you inject.



Hold the Pre-Filled Syringe like a pencil. Do not let the needle touch any surface. Pinch your skin and inject the needle completely into the skin fold at 45° or 90°.



Slowly push the plunger to inject Sematide under the skin making sure all the semaglutide has been injected. Hold the plunger for a few seconds.



Withdraw the Pre-Filled Syringe out of your skin. Press the alcohol swab over the injection spot and dispose of the Pre-Filled Syringe properly.

Note:  
\* Do not reuse the PFS.  
\* The PFS must not be shared.

4000003250




سوئی کو نکالنے سے باہر نکالیں۔ پیرٹ کے چومنے سے اینکشن والے مقام کو داکر پنڈ نکالیں اور کر لیں۔


4000003250



ہینڈل کو آہستہ سے دبا لیں تاکہ سہولت پائی جائے۔ پینڈ نکالیں اور کر لیں۔



پری فیلڈ سیرنج کو پینسل کی طرح چلائیں۔ سوئی کو کسی اور ٹھکانے سے باہر نکالیں اور کر لیں۔




سہولت پانے والے مقام پر پری فیلڈ سیرنج کو پینسل کی طرح چلائیں۔ سوئی کو کسی اور ٹھکانے سے باہر نکالیں اور کر لیں۔




سیرنج سے ہوا نکالنے کے لیے ہینڈل کو آہستہ سے دبا لیں تاکہ سہولت پائی جائے۔ پینڈ نکالیں اور کر لیں۔



پری فیلڈ سیرنج کو پینسل کی طرح چلائیں۔ سوئی کو کسی اور ٹھکانے سے باہر نکالیں اور کر لیں۔



سہولت پانے والے مقام پر پری فیلڈ سیرنج کو پینسل کی طرح چلائیں۔ سوئی کو کسی اور ٹھکانے سے باہر نکالیں اور کر لیں۔



پری فیلڈ سیرنج اور سوئی کو دیکھ کر لیں۔ پینڈ نکالیں اور کر لیں۔



پری فیلڈ سیرنج اور سوئی کو دیکھ کر لیں۔ پینڈ نکالیں اور کر لیں۔

استعمال کرنے کا طریقہ

تھمکنے میں ایک مرتبہ



# سیماتائیڈ

(سیمالوگلوٹائیڈ)

پری فیلڈ سیرنج 0.25mg 0.50mg 1mg



**BIOF**  
BIOSCIENCES

**FEROZSONS**  
LABORATORIES LIMITED

Video Guide (English)



ویڈیو گائیڈ (اردو)